





Mon calendrier de piégeage

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Phase 1 : ne pas piéger	Phase 2 : piégeage limité	Phase 3 : piégeage de printemps	Phase 4 : inutile de piéger	Phase 5 : piégeage d'automne	Phase 1 bis : ne pas piéger						
Conseils											
Phase 1	Ne pas piéger pour éviter la capture des fondatrices des espèces auxiliaires à une période critique.										
Phase 2	<p>Début de la floraison du noisetier et du saule. Apparition de fondatrices.</p> 										
Phase 3 : piégeage de printemps	<p>De la floraison des pruniers et de l'arrivée des hirondelles à la fin de floraison des châtaigniers. C'EST LA PHASE CLÉ. Les fondatrices sont seules et à la recherche de nourriture sucrée. La prise éventuelle d'autres insectes ne perturbera plus le développement des populations. C'est l'action qui évite la prédation et rompt le cycle de développement de la colonisation. Les nids primaires doivent être recherchés et détruits.</p>										
Phase 4 : été	<p>Construction des nids secondaires. Les appâts sucrés sont délaissés. Piégeage difficile. Seuls les appâts « protéinés » restent attractifs (sardines...).</p> <p>Maintenance difficile des pièges. C'est le début de la période de fécondation des futures reproductrices. La destruction des nids est essentielle, mais reste difficile du fait des problèmes de repérage.</p>										
Phase 5 : automne	<p>Avec les premières nuits froides, le piégeage peut redémarrer. Les appâts sucrés redeviennent attractifs. L'objectif principal du piégeage est la diminution de la prédation au rucher. L'utilité de la destruction des nids diminue progressivement.</p>										
Phase 1 bis : hiver	<p>Les nids apparaissent avec la chute des feuilles : les individus restant dans le nid sont voués à mourir et les futures fondatrices ont quitté le nid pour trouver un lieu d'hibernation.</p>										
Conseils											
Ne pas piéger pour éviter la capture des fondatrices des espèces auxiliaires à une période critique.											
<p>Placer les pièges à proximité des endroits les plus attractifs : emplacements des anciens nids, arbres et arbustes mellifères en fleurs, ruchers, points d'eau, compost, passage à essaims...</p>											
<p>Appâts : <ul style="list-style-type: none"> • panaché ; • sirop de fruit + vin ou panaché ; • vin blanc + bière + sirop de cassis ou de framboise ; • etc. Bien entretenir les pièges.</p>											
											
<p>Appâts sucrés : sirop de nourrissage + miel parfumé (bruyère ou châtaignier) + alcool aromatique (porto ou pineau...) Où ? Au rucher.</p>											
<p>À cette période, le piégeage est inutile, les futures fondatrices sont en hibernation. En revanche, penser à repérer les nids secondaires qui n'ont pas été détruits, de nombreuses fondatrices hibernent dans le voisinage. Le moment venu, au printemps, il sera bon de piéger dans les environs.</p>											

Ces périodes sont définies à titre indicatif et les dates doivent être adaptées à chaque région.